

7歳までの 予防接種スケジュール

同時接種の
おすすめ!

(H25年4月版)



同時接種可
↓
同時接種可
↓
同時接種可
↓

同時接種可
↓
同時接種可
↓

おなまえ



さま

ワクチン名		接種済み チェック☑	0歳	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	1歳	1歳1ヶ月	1歳2ヶ月	1歳3ヶ月	1歳4ヶ月	1歳5ヶ月	1歳6ヶ月	1歳7ヶ月	1歳8ヶ月	1歳9ヶ月	1歳10ヶ月	1歳11ヶ月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳
任	B型肝炎	不活	1 ☐	2 ☐	3 ☐																											
任	ロタウイルス	生	1 ☐	2 ☐	3 ☐																											
必	ヒブ	不活	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐																										
必	小児用肺炎球菌	不活	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐																										
必	四種混合 三種混合 ポリオ (IPV単独)	不活		1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐																									
必	BCG	生	1 ☐																													
必	MR (麻しん風しん混合)	生	1 ☐	2 ☐																												
任	おたふくかぜ	生	1 ☐	2 ☐																												
任	みずぼうそう (水痘)	生	1 ☐	2 ☐																												
必	日本脳炎	不活	1 ☐	2 ☐	3 ☐																											
任	インフルエンザ	不活																														
任	A型肝炎	不活	1 ☐	2 ☐	3 ☐																											

ロタウイルスワクチンには、1価ワクチンと5価ワクチンがあります。
できるだけ生後14週6日までに接種を開始し、必要接種回数を受けましょう。

ロタ・ヒブ・肺炎球菌・四種
混合の接種を確実に完了
するため、同時接種をつよ
くおすすめします!!

個別接種の場合は四種混合などと同時接種で受けられます。

1歳の誕生日が来たら同時接種で受けましょう。
MR・おたふくかぜ・みずぼうそうの同時接種は、
ヒブ・肺炎球菌・四種混合の追加接種の1週間後に受けられます。

MR(麻しん風しん混合): 小学校入学の前年(幼稚園・保育
園の年長に相当)1年間に接種(4月~6月がおすすめ)

追加接種は、初回接種から3か月の間隔をあけて受けましょう。

インフルエンザ: 毎年、10月から11月ごろに接種しましょう。

日本脳炎: 9歳で追加接種(接種対象9-12歳)

1歳から受けられます。1回目の2-4週間後に2回目、その約半年後に3回目を接種します。

二種混合(DT): 11歳で追
加接種(接種対象11-1
2歳)

不活 → 不活化ワクチン。
 必 → 定期。多くは公費負担。
 → 定期予防接種の対象年齢。
 ← ① → → おすすめの接種時期(数字は接種回数)。

生 → 生ワクチン。
 任 → 任意。多くは自己負担。
 → 任意接種の接種できる年齢。

→ 同時接種可。

★次に他の種類のワクチンが接種できるのは、不活化ワクチン接種後は1週間後の同じ曜日から、生ワクチン接種後は4週間後の同じ曜日からです。